

เมื่อถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน ต้องทำดังนี้

1. ใช้น้ำล้างแผลให้เร็วที่สุดด้วยน้ำและสบู่หลายๆ ครั้ง ให้ถึงกัน แผล ล้างสบู่อกให้หมด เช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อรักษาแผลสด
2. จดจำสัตว์ที่กัดให้ได้เพื่อสืบหาเจ้าของ / กักสัตว์ไว้ดูอาการ 10 วัน สอบถามประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
3. ไปหาหมอหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรับการป้องกัน ที่ถูกต้อง

คำแนะนำสำหรับคนเลี้ยงสุนัข

1. นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทุกปี (ปีแรกควรฉีด 2 ครั้ง)
2. ไม่ปล่อยให้สุนัขไปเล่นพ่วนในที่สาธารณะ ทุกครั้งที่น่าสุนัข ออกนอกบ้าน ต้องอยู่ในสายจูง
3. ไม่นำสุนัขไปปล่อย และต้องคุมกำเนิดไม่ให้มีสุนัข มากเกินไป



“ปีหนึ่งคนไทยถูกสุนัขกัด
ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน”

เมื่อถูกสัตว์สงสัยป่วย
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือข่วน

**ต้องล้างแผลใส่ยา
กักหมา 10 วัน และหาหมอ**



งานบริหารสาธารณสุข
สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งทอง



T.044-816838
(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)



T.081-8741808
(นางจิราพรรณ การสุวรรณ)



sataranasuk_54404@hotmail.com



โรค พิษสุนัขบ้า



โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า (**Rabies**) หรือโรคกลัวน้ำ (**Hydrophobia**) คือโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่อันตรายร้ายแรง โดยผู้ป่วยที่สัมผัสกับสัตว์ติดเชื้อจะได้รับเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าในตระกูล (**Rhabdoviridae**) ผ่านทางน้ำลายของสัตว์ที่กัด ทำให้เกิดอาการทางระบบประสาท เช่น ชัก ประสาทหลอน อัมพาต โดยโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคร้ายแรงถึงชีวิต เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรค อย่างไรก็ตามโรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สัตว์ที่อาจเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้าได้แก่ สัตว์จำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว ค้างคาว สุนัขจิ้งจอก แรคคูน และสัตว์ป่าหลายชนิด โดยสุนัขจรจัดมีแนวโน้มที่จะเป็นพาหะแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสู่คนได้มากที่สุด



อาการที่พบในคน

ส่วนใหญ่ระยะฟักตัวของโรคตั้งแต่ **3 สัปดาห์ - 6 เดือน** แต่บางรายมีระยะฟักตัวสั้นมาก ไม่ถึงสัปดาห์ หรืออาจนานเกิน **1 ปี** อาการเริ่มแรกคือ เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคันรุนแรงบริเวณที่ถูกกัด แล้วลามไปส่วนอื่น กระสับ กระส่าย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ กลืนลำบาก โดยเฉพาะของเหลว กลืนน้ำ ปวดท้องน้อยและขา กล้ามเนื้อกระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เกร็ง อัมพาต หมดสติ และตายในที่สุด

อาการที่พบในสุนัข

ระยะฟักตัวของโรคหลังจากถูกกัดหรือข่วนจะอยู่ในช่วง **3-8 สัปดาห์** ไม่เกิน **6 เดือน** และจะตายภายใน **10 วัน** หลังจาก แสดงอาการ ซึ่งมีทั้งแบบดุร้าย และแบบซึม โดยแบ่งเป็น **3** ระยะแรก

สุนัขจะมีอารมณ์และนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม ระยะตื่นเต้น

สุนัขเริ่มมีอาการทางประสาท กระวนกระวาย ตื่นเต้น หงุดหงิด ไม่อยู่นิ่ง กัดแทะสิ่งของไม่เลือก ม่านตาขยายกว้าง

ระยะอัมพาต

สุนัขมีอาการทางตก ลิ้นมีสีแดงคล้ำ ห้อยออกนอกปาก น้ำลายไหล ขยี้หน้าอาหารคล้ายมีอะไรอยู่ในลำคอ หนาวเย็นเกร็งตัว ไม่ได้ล้มลง อัมพาตถึงตัวอย่างรวดเร็วและตายในที่สุด



คาถา 5 ย กันสุนัขกัด



ย1

อย่าแหย่สุนัขให้โมโห

ย2

อย่าเหยียบหาง หัว ตัว ขา หรือ ทำให้สุนัขตกใจ

ย3

อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกัน ด้วยมือเปล่า

ย4

อย่าหยิบจานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ขณะสุนัขกำลังกินอาหาร

ย5

อย่ายุ่ง หรือเข้าไปใกล้สุนัขที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ

